

Oliviers

Les variétés listées dans le tableau ont été suivies sur un seul site, à Maillane (13) :

Variétés	Code GEVES	Numéro de page
Aglandau	3	2
Cayon	3	3
Grossane des Baux	3	4
Lucques	3	5
Négrette	4	6
Picholine du Gard	3	7
Rougette de l'Ardèche	Absente	8
Salonenque	3	9
Tanche	3	10
Verdale de l'Hérault	3	11

Code GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences) correspondant à chaque variété :

3 : Rubrique II, Classe 1. Variétés confirmées après expérimentation et classées dans la catégorie : « variétés recommandées » pour la production.


4 : Rubrique II, Classe 2. Variétés confirmées après expérimentation et classées dans la catégorie : « autres variétés » que celles recommandées pour la production.

E : Variétés anciennes d'amateurs regroupant les variétés de plus de 30 ans, peu ou très peu diffusées, présentant ou étant susceptibles de présenter un intérêt :

- en raison de leur qualité de rusticité dans des terroirs,
- comme élément du patrimoine culturel français,
- comme élément du patrimoine génétique.

Absente : Désigne les variétés qui ne sont pas inscrites au Catalogue Officiel du GEVES.

• Œil de paon



Aglandau

Synonymes : Verdale de Carpentras, Berruguette, Blanquette, Plan d'Aix, Cayanne de Marseille, Plan de la Fare.



Origine : française, 1^{ère} inscription 1986.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : vigueur moyenne, bonne résistance au vent. Rustique pour sols légèrement calcaires.

Port : semi-érigé, en boule.



Compatibilité florale : autofertile. Picholine, Cailletier.

Maturité : assez tardive, novembre à décembre dans le Sud-Est.

Fruit : ferme, contenant peu d'eau. Un peu arrondi, légèrement côtelé, bosselé, de taille moyenne, épiderme vert clair qui passe ensuite à un violet de plus en plus foncé. Olive riche en huile.

Consommation : utilisée pour son huile qui se conserve bien, en olive verte ou noire.

Remarque : variété qui alterne moins si elle est bien irriguée.

	Date floraison	Date récolte
Aglandau	03-juin 2011	Novembre à décembre
Référence	Variété de référence	Variété de référence

Données référencées :

Maladies : sensible à l'œil de paon, la teigne, la cochenille noire et à la fumagine. Résistante à la mouche de l'olive et à la verticilliose.

Comportement vis-à-vis du gel : résistante au gel.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2014 : moyennement atteinte par l'œil de paon.

Cayon

Synonymes : Cayoun, Plant d'Entrecasteaux, Entrecastelen, Race de Montfort.

Origine : française, 1^{ère} inscription 1986.

Classe de Catalogue : 3.

Arbre : peu vigoureux à vigoureux.

Port : pyramidal, dressé.



Maturité : tardive.

Compatibilité florale : autostérile, Amygdalolia, Cornicabra, Manzanille.

Fruit : petit calibre, ovoïde, bonne saveur.

Consommation : utilisée pour l'huile.

	Date floraison	Date récolte
Cayon	03-juin 2011	
Référence	jours après Aglandau, jours après Grossane des Baux.	jours après Aglandau, jours après Grossane des Baux

Données référencées :

Maladies : sensible à la mouche de l'olivier.

Comportement vis-à-vis du gel : moyennement sensible au gel.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : moyennement atteinte par l'œil de paon.

2013 et 2014 : fortement touchée par l'œil de paon.

Grossane des Baux

Synonyme : Groussan

Origine : française, 1^{ère} inscription 1970.
Classe du Catalogue : 3.
Arbre : rustique, peu d'alternance de production.
Port : étalé.



Maturité : moyenne.
Compatibilité florale : auto fertile.
Fruit : rond, charnu, à peau lisse.
Consommation : utilisation en olive noire (saveur douce et sucrée), piquée au sel et pour l'huile.

Données 2011

Grossane des Baux**Référence****Date floraison**

Variété de référence

Date récolte

Variété de référence

Données référencées :

Maladies : sensibilité à la teigne, à la cochenille et à la fumagine.

Comportement vis-à-vis du gel : résistante au gel.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : moyennement atteinte par l'œil de paon.

2013 et 2014 : sensibilité à l'œil de paon assez importante.

Lucques

Origine : française, 1^{ère} inscription 1970.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : vigueur moyenne.

Port : étalé.



Maturité : tardive.

Compatibilité florale : mâle stérile. Amellau, Corniale, Cayon, Cornicabra.

Fruit : allongé, en forme de croissant, peau lisse. Charnu, bosselé, noyau peu épais, beaucoup de chair.

Consommation : utilisée en olive verte, conserve, huile.

Données 2011

Date floraison

Date récolte

Lucques

Référence

jours après Aglandau

jours après Aglandau

Données référencées :

Maladies : sensible à la mouche, à l'œil de paon et à la cochenille.

Comportement vis-à-vis du gel : peu sensible au gel.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : moyennement atteinte par l'œil de paon.

2013 et 2014 : sensibilité à l'œil de paon assez importante.

Négrette

Noirette, Négret

Origine : française (Gard), 1^{ère} inscription 1986.

Classe du Catalogue : 4.

Arbre : rustique, pas d'alternance, doit être taillé tous les ans.

Port : érigé.



Maturité : novembre à décembre en Ardèche.

Fruit : petit calibre, bonne saveur.

Consommation : utilisée pour l'huile.

Données 2011	Date floraison	Date récolte
Négrette		Novembre à décembre
Référence	jours après Aglandau	jours après Aglandau

Données référencées :

Maladies : Aucune information disponible.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : pas atteinte par l'œil de paon.

2013 et 2014 : faible sensibilité à l'œil de paon.

Picholine du Gard

Origine : française, 1^{ère} inscription 1970.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : vigueur moyenne, rustique, productive.

Port : bas.



Maturité : décembre à janvier (dans le Gard).

Fruit : calibre moyen, forme allongée, pointue à l'extrémité. Peau lisse.

Chair : ferme et fine.

Consommation : utilisée pour l'huile (rendement moyen), en olive verte de table ou pour cocktail.

Données 2011	Date floraison	Date récolte
Picholine du Gard	03-juin	
Référence	jours après Aglandau	jours après Aglandau

Données référencées :

Maladies : résistante aux maladies.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 et 2014 : pas atteinte par l'œil de paon.

2013 : faible sensibilité à l'œil de paon.

Rougette de l'Ardèche

Origine : française (Ardèche).

Arbre : pas d'alternance.

Port : étalé.



Maturité : décembre à mi-janvier (en Ardèche).

Compatibilité florale : auto fertile.

Fruit : calibre moyen, ovoïde, épiderme rougeâtre à maturité.

Consommation : utilisée pour l'huile.

Données 2011

Rougette de l'Ardèche

Référence

Date floraison

jours après Aglandau

Date récolte

jours après Aglandau

Données référencées :

Maladies : résistante à l'œil de paon. Sensible à la mouche de l'olive.

Comportement vis-à-vis du gel : résistante au gel.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 et 2014 : pas atteinte par l'œil de paon.

2013 : moyennement sensible à l'œil de paon.

Salonenque

Origine : française, 1^{ère} inscription 1970.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : vigueur faible.

Port : semi-pleureur.



Compatibilité florale : partiellement auto fertile.

Maturité : Novembre (dans la vallée de Baux de Provence).

Fruit : pyriforme, bosselé. Bourrelet sur le côté.

Chair : blanche.

Consommation : utilisée en olive verte ou pour l'huile.

Données 2011

Salonenque

Référence

Date floraison

jours après Aglandau

Date récolte

Novembre

jours après Aglandau

Données référencées :

Maladies : bonne résistance aux maladies.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : Aucune information disponible.

2013 : idem : arbre qui reprend mais trop petit pour pouvoir évaluer les symptômes

2014 : sensibilité très faible à l'œil de paon.

Tanche

Olive de Nyons, Tanche de Nyons.

*Origine : française, 1^{ère} inscription 1970.**Classe du Catalogue : 3.**Arbre : très vigoureux, résistant au froid.**Port : forme en boule.**Maturité : Décembre à janvier (dans la Drôme).**Compatibilité florale : auto-stérile. Cayon.**Fruit : forte tendance à la parthénocarpie. Petit calibre, rond.**Chair : Chair brun violacé.**Consommation : utilisée en olive noire ou pour l'huile.*

Données 2011

	Date floraison	Date récolte
Tanche	03-juin	Décembre à janvier
Référence	jours après Aglandau	jours après Aglandau

*Données référencées :**Maladies : sensible à la mouche et à l'œil de paon.**Comportement vis-à-vis du gel : résistante au gel.**Observations de terrain :**Sensibilités relevées de 2010 à 2014 : extrêmement sensible à l'œil de paon : variété qui présente le plus grand nombre de symptômes.*

Verdale de l'Hérault

Olive de Ganges, Gangeole, Redounale, Rousset

Origine : française, 1^{ère} inscription 1970.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : petit développement, vigueur moyenne.

Peu alternant.

Port : dressé



Maturité : tardive.

Compatibilité florale : partiellement auto-stérile.

Fruit : calibre moyen, rond.

Chair : comporte de petites tâches claires.

Consommation : utilisée en olive verte et pour l'huile.

Données 2011	Date floraison	Date récolte
Verdale de l'Hérault	03-juin	
Référence	jours après Aglandau	jours après Aglandau

Données référencées :

Maladies : sensible au verticillium, à la mouche de l'olive et à l'œil de paon.

Comportement vis-à-vis du gel : très résistante au gel.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2011 : peu atteinte par l'œil de paon.

2013 et 2014 : très sensible à l'œil de paon, en revanche