




Figuiers

Variétés	Numéro de page
Bourjassote Noire	2
Dauphine	3
Longue d'août	4
Marseillaise	5
Noire de Barbentame	6
Noire de Caromb	7
Pastillière	8

- **Teigne**



- **Chancre**

Une seule variété présente du chancre en 2013 : Noire de Barbentane, sur un des deux plants.

Bourjassotte Noire

V. Solliès

Formation

ppement, assez
unifère.



Bourjassotte Noire

Floraison : tardive, une seule récolte par an.

Fruit : gros calibre (70g), aplati. Epiderme fin mais résistant, bleu ardoise, presque noir, prumineux. Se conserve bien.

Chair : rouge vif, sucrée à maturité, douce, parfumée. Très juteuse.

Consommation : fruit de table, pour conserverie ou pâtisserie, confiture, bonne tenue à la cuisson.

Remarque : variété sensible à l'éclatement en cas d'excès d'eau dans le sol.

Date floraison

Date récolte

mi-août à fin
octobre

Dauphine

Origine : Aucune information disponible.

Arbre : vigoureux, bifère (la plus grosse récolte fin juin à début août puis mi-août à mi-octobre), productif et peu exigeant

Port : buissonnant.

Grise de Tarascon, R
d'Argenteuil,
Violette Dauphine, B



Floraison : juillet à août.

Fruit : gros calibre, rond avec un œil très marqué ; noir, pédoncule très court et violacé. Peau fine. Supporte bien le transport.

Chair : rose, ferme, très juteuse, sucrée.

Consommation : fraîche ou en confiture.

Remarque : le fruit peut avoir tendance à fermenter en cas d'humidité



années 2011
Dauphine

n
colte
Début juillet

Données référencées :

Maladies : Asensibilité forte aux maladies.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilité aux maladies de 2011 à 2013 : assez fortement attaquée par la tavelle en 2011 ; un peu moins marqué en 2013.

Longue d'Août

Banane, Smyrne, Jeune

*ix, bifère (récolte
nombre-octobre).*



Fruit : très gros calibre, pyriforme. Epiderme lisse, vert jaunissant ponctué de lenticelles blanches fines, pédoncule court.

Chair : plus ou moins sucrée, parfumée, juteuse.



Données 2011

Longue d'Août

Date floraison

Date récolte

Début juillet
Puis septembre-
octobre

Données référencées :

Maladies : Aucune information disponible.

Comportement vis-à-vis du gel : très résistante aux gelées.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de de 2011 à 2013 : moyennement attaquée par la teigne.


Marseillaise

Blanquette, Figue de Marseille, Figue de Naples, Petite Marseillaise, Couille du Pape, Blanche de Marseille.

Origine : Française.

Arbre : 4 à 6m, vigueur moyenne, très trapu, unifère. Productif et rustique. Sujet à l'alternance. Il résiste bien à la sécheresse et aux intempéries.

Port : érigé.



Floraison : juillet à août.

Fruit : petit calibre, forme arrondie. Epiderme fin vert puis jaune doré taché de marron à maturité. Pédoncule court.

Chair : rosée à rougeâtre à pleine maturité, ferme, fondante, très sucrée, parfumée. Très bonne qualité gustative

Consommation : figes séchées ou confites, mais aussi en frais, en cuisson ou en confiture.

Données 2011

Marseillaise

Date floraison

Date récolte

05-juillet

Données référencées :

Maladies : sensible au botrytis.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de de 2011 à 2013 : peu à Moyennement attaquée par la teigne.

Noire de Barbentane

Origine : Provence.
Arbre : très vigoureux, développement important.
Port : Aucune information



Floraison : septembre à octobre.
Compatibilité florale : Aucune information disponible.
Fruit : gros calibre, épiderme violet.
Chair : bien parfumée.



Données 2011

Date floraison

Date récolte

Noire de Barbentane

05-juillet

Données référencées :

Maladies : Aucune information disponible.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de de 2011 à 2013 : moyennement attaquée par la teigne en 2011, en revanche l'attaque est faible en 2013. Par ailleurs, il s'agit de la seule variété atteinte par le chancre.

Noire de Caromb

Douqueira Negra.

Origine : Italienne.

Arbre : vigoureux, développement important, bifère (première récolte début juillet, et figues d'automne à partir de fin août).

Port : Aucune information disponible.



Floraison : septembre à octobre.

Fruit : calibre moyen, de forme allongée, épiderme violet. Figs d'automne plus petites et plus brillantes.

Chair : rose, très sucrée, parfum chocolaté, bonne qualité gustative.

Consommation : fraîche ou en confiture, bonne tenue à la cuisson. La figue d'automne se sèche.

Données 2011

Date floraison

Date récolte

Noire de Caromb

Début juillet

Données référencées :

Maladies : sensible au psylles du figuier.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de de 2011 à 2013 : très fortement attaquée par la teigne en 2011 ; l'attaque est plus modérée en 2013.

Pastillière

Origine : japonaise.
Arbre : peu vigoureux, unifère.
Port : érigé.

Hirta du Japon, Pastel
 Rouge de Bordeaux.



Floraison : précoce
Fruit : calibre moyen (50 à 60g), forme ovale. Epiderme velouté, violet tirant sur le noir. Pédicelle généralement court.
 Se conserve et se transporte bien.
Chair : rouge vif, juteuse, peu parfumée, tendre.



Données 2011

Pastillière

Date floraison

Début août

Données référencées :

Maladies : Aucune information disponible.

Comportement vis-à-vis du gel : l'absence de figes fleurs lui évite de craindre les gelées tardives.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de de 2011 à 2013 : moyennement attaquée par la teigne.